

Тема: Сифилис первичный и вторичный.

- 1. К КЛАССИЧЕСКИМ ВЕНЕРИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ ОТНОСИТСЯ**
- 2. СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ СИФИЛИСЕ**
- 3. ВЫСЫПАНИЯ ПРИ ВТОРИЧНОМ СВЕЖЕМ СИФИЛИСЕ:**
- 4. ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ТВЕРДОГО ШАНКРА НА НИЖНЕЙ ГУБЕ РЕГИОНАРНЫЙ СКЛЕРАДЕНИТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**
- 5.ВТОРИЧНЫЙ ПЕРИОД СИФИЛИСА НАЧИНАЕТСЯ С РАЗВИТИЯ**
- 6. ВЕГЕТИРУЮЩИЕ ПАПУЛЫ («ШИРОКИЕ КОНДИЛОМЫ») ПРИ ВТОРИЧНОМ РЕЦИДИВНОМ СИФИЛИСЕ ОБЫЧНО ВОЗНИКАЮТ**
- 7. СИФИЛИТИЧЕСКОЕ РАУСЕДО – ЭТО**
- 8. ТВЕРДЫЙ ШАНКР ВСЕГДА РАСПОЛАГАЕТСЯ**
- 9. ИППП, ВЫЗЫВАЕМЫЕ СПИРОХЕТАМИ**
- 10. ТВЕРДЫЙ ШАНКР ЭТО**
- 11. СКЛЕРАДЕНИТ ПРИ СИФИЛИСЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**
- 12. ВОЗБУДИТЕЛЬ СИФИЛИСА НАЗЫВАЕТСЯ**
- 13. ВЫСЫПАНИЯ НА КОЖЕ ПРИ ВТОРИЧНОМ СИФИЛИСЕ**
- 14. ПЕРВИЧНЫЙ ПЕРИОД СИФИЛИСА НАЧИНАЕТСЯ С ПОЯВЛЕНИЯ**
- 15. СКЛЕРАДЕНИТ ПОЯВЛЯЕТСЯ**
- 16. «БЛЯШКИ СКОШЕННОГО ЛУГА» ВОЗНИКАЮТ НА**
- 17. «ШАНКР-АМИГДАЛИТ» РАСПОЛАГАЕТСЯ**
- 18. СИФИЛИТИЧЕСКАЯ АЛОПЕЦИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ:**
- 19. ПРИ СИФИЛИСЕ МАЛОЙ КОНТАГИОЗНОСТЬЮ ОБЛАДАЮТ**
- 20.ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ СИФИЛИСЕ ЧАЩЕ ВСЕГО СОСТАВЛЯЕТ**
- 21.ТВЕРДЫЙ ШАНКР ОТЛИЧАЕТСЯ ОКРАСКОЙ**

22. ЛЕЙКОДЕРМА –ЭТО

23. АЛОПЕЦИЯ – ЭТО

24. ТВЕРДЫЙ ШАНКР ВСЕГДА РАСПОЛАГАЕТСЯ

25. ВТОРИЧНЫЙ ПЕРИОД СИФИЛИСА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ